

## LAS VACUNAS (Perros): Leptospirosis



La leptospirosis es causada por una bacteria y puede ser fatal. (Y también puede afectar a las personas). Afecta principalmente al hígado y / o los riñones de un perro. Los síntomas más comunes son fiebre, pérdida de apetito, vómitos, dolor muscular, encías amarillas y sangrado o hematomas.

Cómo se propaga: la bacteria se transmite a través de la orina de ratas, mapaches, zorrillos y zarigüeyas, así como de cerdos y ganado. Los perros están expuestos a la bacteria bebiendo, nadando o caminando a través del agua contaminada por la orina infectante de los animales que acabamos de mencionar. ¿Qué perros corren mayor riesgo? Si cualquiera de estas condiciones se aplica a su perro, definitivamente debe vacunarse contra la leptospirosis: perros que tienen acceso a agua estancada, estanques y arroyos. Cualquier situación donde la vida silvestre (mapaches, zorrillos, zarigüeyas y ratas) pueda entrar en su jardín. Perros que van a acampar con sus dueños. Perros que tienen acceso a áreas boscosas. Perros que están alrededor del ganado.

Comentarios del Dr. Bob: Afortunadamente, vemos muy pocas reacciones a las vacunas, especialmente con la alta calidad de las vacunas que utilizamos. Pero las 2 vacunas con mayor probabilidad de causar una reacción son la Rabia y la Leptospirosis, y aun así, es mucho más probable que ocurra en razas muy pequeñas de perros. Dado que es menos probable que los perros muy pequeños estén expuestos a la Leptospirosis Y dado que los pequeños son más propensos a tener una reacción adversa a la vacuna (aunque el riesgo es aún muy bajo), tendemos a evitar administrar la vacuna Lepto a estos perros más pequeños